

平成25年度 春季京都府高等学校野球大会 1次戦

平成25年4月14日(日)～

【市 部】

試合開始時間 ①=10:00

②=12:30

赤字=シード校

青字 · = OB在籍校

[illegible]

Phylogenetic tree showing relationships between various groups. The tree is rooted at the bottom with '木津' (12) and '乙訓' (11). '木津' (12) and '乙訓' (11) are sister taxa with a bootstrap value of 1. '乙訓' (11) is sister to a clade containing '京都学園' (10) and '京都八幡' (9) with a bootstrap value of 10. '京都学園' (10) and '京都八幡' (9) are sister taxa with a bootstrap value of 0. This clade is sister to a larger clade with a bootstrap value of 6. This larger clade contains '南丹' (8) and '紫野' (7). '南丹' (8) and '紫野' (7) are sister taxa with a bootstrap value of 5. The entire tree is supported by a bootstrap value of 14 at the base of the '乙訓' (11) and '木津' (12) clade. A label 'B' is placed to the right of the tree.

Phylogenetic tree of the C gene region for various Japanese rice varieties. The tree shows relationships between varieties: Hana Ueno (13), Tohoku (14), Kyoto Meiji (15), Yamashiro (16), Hisago (17), and Kyoto Suzubaru (18). Bootstrap values are indicated at the nodes. A scale bar of 0.1 is shown at the bottom.

品種	番号
花園	13
東稜	14
京都明徳	15
山城	16
久御山	17
京都すばる	18

北嵯峨 19
園部 20
洛星 21
塔南 22
龜岡 23
南陽 24

0 5 10

9 5 8 7 1 0 15 3

[illegible]

向陽 31
京都文教 32
北桑田 33
立命館宇治 34
堀川 35

4
1
9
8
4
2
11
F

鴨 派 36
桃 山 37
同 志 社 38
京 都 兩 洋 39
東 山 40

```
graph LR
    G((G)) --- N1(( ))
    N1 --- N2(( ))
    N1 --- 8[8]
    N2 --- 3[3]
    N2 --- N3(( ))
    N3 --- 4[4]
    N3 --- N4(( ))
    N4 --- 5[5]
    N4 --- 1[1]
    5 --- 36[36]
    5 --- 37[37]
    1 --- 38[38]
    1 --- N5(( ))
    N5 --- 3[3]
    N5 --- 4[4]
    3 --- 39[39]
    4 --- 40[40]
```

朱 雀 41
洛 水 42
田 辺 43
洛 西 44
須 知 45

```
graph LR; Root(( )) ---|0| Node1(( )); Node1 ---|14| Node2(( )); Node1 ---|5| Node3(( )); Node2 ---|41| Akai[朱 雀 41]; Node2 ---|12| Node4(( )); Node4 ---|42| Rokusei[洛 水 42]; Node4 ---|9| Tanabe[田 辺 43]; Node3 ---|44| Rokusei2[洛 西 44]; Node3 ---|2| Suzuki[須 知 45];
```

H

Phylogenetic tree showing relationships between five Japanese universities. The tree is rooted at the bottom with Kyoto University of Education (京都外大西) as the outgroup. The main clade consists of three groups: a sister pair of Fukuoka University (伏見工) and Kyoto University (京都産大附) with a bootstrap value of 11; a sister pair of Education University (教育大附属) and Chiyoda City University (城陽) with a bootstrap value of 18; and a sister pair of these two groups with a bootstrap value of 0. The bootstrap values for the internal nodes are 7 and 1.

University	Accession Number	Bootstrap Value (Node)
伏見工	46	11
京都産大附	47	11
教育大附属	48	18
城陽	49	18
京都外大西	50	0

京都廣学館 (京都) 51

京都成章 52

日吉ヶ丘 53

嵯峨野 54

城南菱創 55

2

12

5

4

6

5

4

3

J

立命館 56
京都国際 57
鳥羽 58
西乙訓 59
農芸 60

3
2
3
7
7
29
0

K

京都翔英 龍谷大平安
の2校は、2次戦から出場

【北部】

舞鶴高専 1
福 知 山 2
福知山成美 3
大 江 4
府立工業 5

0
2 8 7
11 M
1 0
7

```
graph BT; 5 --- 7 --- 4 --- 1 --- 0; 5 --- 7 --- 4 --- 1 --- 0; 5 --- 7 --- 4 --- 1 --- 0; 5 --- 7 --- 4 --- 1 --- 0; 5 --- 7 --- 4 --- 1 --- 0;
```

峰山 6
海洋 7
加悦谷 8
日星 9
綾部 10

14
0
2
4
4
3
3
1

N

西舞鶴 11
久美浜 12
網野 13
東舞鶴 14
宮津 15
京都共栄 16

6
6
7
2
7
1
5
3
6
○

平成25年度 春季京都府高等学校野球大会 2次戦

東 宇 治	5/4 太 10:00	3	4	5/11 わ 9:30	4	1	
乙 訓		4			6		
西 城 陽	5/4 太 12:30	0	10			5/18 わ 9:30	4
龍谷大平安		10					
鳥 羽	5/4 福 10:00	9	0	5/13 わ 10:00	1	4	
洛 西		0			7		
福知山成美	5/4 福 12:30	8	2			5/19 わ 11:00	優勝
峰 山		2					
京都成章	5/5 太 10:00	3	5	5/12 わ 8:30	6	5	
北 嵯 峨		5			5		
京都外大西	5/5 太 12:30	3	13			5/18 わ 12:00	3
京都翔英		13					
東 山	5/5 福 10:00	3	6	5/12 わ 11:00	7	4	
立命館宇治		6			0		
京都すばる	5/5 福 12:30	5	2				
西 舞 鶴		2					

《 球 場 》 太 : 太陽ヶ丘球場
福 : 福知山球場

わ : わかさスタジアム
(西京極球場)

平成25年度 春季近畿地区高等学校野球大会

智辯学園 (奈良2位)	5/25	5	4	6/1	5	7
箕 島 (和歌山)		4				
神戸国際大付 (兵庫)	5/25	6	0		8	
近 江 (滋 賀)		0		6/2		
檀原学院 (奈良3位)	5/26	0	7	6/1	1	8
鳥 羽 (京都)		7			6	
奈良大付 (奈良1位)	5/26	2	3			
履正社 (大 阪)		3				

奈良県 : 佐藤薬品スタジアム

第1試合 10:00

優 勝 履 正 社
準優勝 神戸国際大付